

四庫全書

子部

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷二十三

休寧程林纂

婦人門

氣血統論

論曰血為榮氣為衛行陰行陽晝夜共行五十度周於
身內之五臟六腑外之百骸九竅莫不假此而致養矧
婦人所稟純陰以血為本以氣為用在上為乳飲在下

為月事養之得道則榮衛流行而不乖調之失宜則氣血愆期而不應衛生之經不可不察

婦人月水不通

論曰婦人月水不通者所致不一有氣不化血微不通有先期太過後期不通有大病後熱燥不通有凝寒結滯不通有積聚氣結不通有心氣抑滯不通凡此所受不同治之亦異蓋女人假血為本以氣為用血氣稽留則澁而不行其為病或寒或熱或臍腹堅痛或肌肉消

瘦久而不治則為勞瘵之症

地黃煎丸 治月水不行心忪悸身體熱面頰紅赤食
味不美臍下刺痛腰膝重

生地汁

青蒿汁

生薑汁

一鍾共
熬膏

麒麟竭

沒藥

去油

玄胡索

凌霄花

紅藍花

五錢

共末用膏丸彈子大酒下一丸

當歸湯 治血澁不行心忪肌熱腰重腹痛不可忍

川歸

丹皮

川芎

白芍

牛膝

麥蘖

玄胡索

桂心

錢五

琥珀

沒藥

炙去油
一分

水煎三錢溫服日二

婦人月水不斷

論曰女人以衝任二經為經脉之海手太陽小腸之經與手少陰心之經者此二經相為表裏主下為月水若勞傷經脉則衝任氣虛衝任既虛則不能制其氣血故令月事來而不斷也

白茯苓散 治女人血海不調因虛冷成疾致月水不

絕及赤白帶下面色萎黃

白茯苓 木香 懷熟地 石菖蒲 秦艽

栝子仁 青皮 兔絲子 赤石脂 烏賊魚骨

訶勒皮 川歸 五加皮 半角鰓燒 杜仲

艾葉燒存性
一兩

共為末不拘茶飲酒任下二錢日二

川歸丸 治月水不斷或多或少四肢倦身瘦瘁

川歸三兩 地榆 人參 白朮 白茯苓 鹿茸

白龍骨 阿膠 白芍 卷栢 石斛 蒲黃

紫朴

一兩

桂心

枳殼

二兩

懷熟地

三兩

共末蜜丸梧子大酒下三十九日二

地黃湯 治衝任氣虛經血虛損月水不斷綿綿不止

懷生地

二兩

子芩

川歸

側栢葉

兩半

熟艾

五錢

水煎三錢入蒲黃一錢食前溫服日二

一方加地榆伏龍肝

白芍藥湯 治月水經久不斷

白芍藥

炒

側柏葉

炙各二

用水酒同煎三錢溫服未差再服

婦人月水來腹痛

論曰月水乃經血之餘和調則所下應期無過舉不及之患若衝任氣虛為風冷所乘致氣脉不順所下不調或先或後或多或少風冷之氣與月事相擊故因所下而腰背拘強臍腹刺痛也

川歸飲 治月水不調及欲來臍下痛肌體熱

川歸 白朮 人參 白芍 枳殼 紫朴

肉豆蔻 甘草

五錢

水煎三錢溫服日二

丹皮湯 治月水來而不利攻臍腹痛不可忍

丹皮 人參 川芎 子芩 甘草 乾薑

吳茱萸 桂心

兩半

白芍 白朮 川歸

一兩

桃仁

八十枚炒

水煎三錢服

白芍湯 治月水來腹痛煩悶體熱

白芍藥 紫朴 人參 甘草 川歸

兩一

枳殼 肉豆蔻

兩三

錢五

水煎三錢溫服日二

川芎丸 治月水來腰腹刺痛不可忍或多或少或來如清水豆汁虛乏黃瘦

川芎 白芷 生地 桃仁 黑乾薑

去皮尖炒一兩

蒲黃 甘草 人參 白芍 丹皮 牛膝

錢五

桂心 川歸

分三

共末入蜜杵九梧子大酒下二三十丸日二

室女月水不通

論曰女子二七而天癸至任脉通月事以時下若稟受不足或任脉為風寒所搏致令風氣凝結不能應時而下經久不治則致勞疾

人參湯 治室女思慮太過心氣不足氣結不得宣利月水不依時或久不通或血隔成勞漸有寒熱肌肉不

生不思各味凡此病症不可復行破血急性之藥宜通
心氣行榮衛滑經絡

人參 白芍 麥冬 丹皮 檳榔 草薢

大腹皮 白朮 川芎 生地 桔梗 防己

枳殼 丁香皮 甘草 茯苓 川歸

一兩

桂心 大黃 遠志

生薑大棗水煎三錢入酒少許溫服日二

赤芍藥散 治室女月水不通

赤芍 牛膝 人參 木香 甘草 丹皮

玄胡索

川芎

五錢

桂心

川歸

三分

桃仁

去皮尖炒

一兩

共末酒下二錢

沉香湯 治室女榮衛凝澁月水不利目昏悶肢體拘急五心虛煩多困少力

沉香

檳榔

甘草

三兩

人參

木香

桂心

川歸

生地

白茯苓

陳皮

青皮

柴胡

鼈甲

醋炙
兩半

生薑水煎三錢溫服日二

羚羊角湯 治室女元氣不足虛勞內燥月水不利四

肢少力頰赤口乾五心煩熱

羚羊角

防風

地骨皮

川芎

黃芪

蜜炙

赤茯苓

桂心

麥門冬

防風

炙甘草

一兩

懷生地

三兩

羌活

酸棗仁

炒

川歸

紅花子

白芍藥

兩半

生薑三片薄荷七片水煎三錢入酒少許溫服日二
二地散 治室女月水不通臍腹下刺痛

懷生地

懷熟地

四兩

桂心

川歸

二兩

共末酒下二錢日二

帶下

論曰帶下有三十六種名雖不同其所致則一蓋婦人
衝任為經脉之海上為乳汁下為月事血氣和平則生
育之道得矣苟乖于保養風寒乘虛襲于經絡衝任不

能循流血氣蘊積冷熱相搏故成帶下冷則色白熱則色赤冷與熱并則赤白雜下間有五色者各隨五臟虛損而應焉

川芎湯 治帶下漏血不止

川芎 吳茱萸 白芍藥 黃芪 炙甘草

黑乾薑

川歸

一兩

懷熟地

二兩

水煎三錢溫服日二

桑寄生湯 治三十六種帶下

桑寄生 熟艾 川芎 鹿角膠一兩 川歸二兩

用酒水合煎三錢溫服日二若口乾渴者加白茅根

懷生地麥門冬一兩

龍骨散 治三十六種帶下不止

白龍骨 黑乾薑一兩 黃牛角鰓燒灰三兩

禹餘糧醋淬七次 續斷 阿膠炒 川歸五錢

共末酒下一二錢日二以差為度

側柏葉散 治帶下腹痛

側柏葉

炙二兩

白芍藥

川芎

牡丹皮

白芷

黑乾薑

一兩

川歸

五錢

共末酒下二錢日二

禹餘糧散

治帶下五色久不止

禹餘糧

淬醋七次研

鹿茸

赤石脂

二兩

烏賊魚骨

去甲燒灰兩半

阿膠

炒

川歸

白芍藥

蒲黃

一兩

牡蠣

童便淬二兩

共末酒下二錢日二

川歸散 治帶下白黃不止體瘦繞臍腹痛

川歸 附子 白朮 白龍骨 桂心

鹿角膠

粉炒
一兩

共末酒下一二錢日二飲下亦可

漏下

論曰漏下之病經血淋瀝不斷是也夫衝任之脉所至有時若非時而下猶器之津洩故名之漏下蓋由血虛氣衰不能約制又有瘀血在內因冷熱不調致使血敗

其色或赤如豆汁黃如爛瓜黑如鮓青如藍白如膿五色隨五臟虛損而漏應焉

沉香丹皮丸 治內挾瘀血月水淋瀝不止或多或少四肢煩倦

沉香 人參 丹皮 赤芍 川歸 木香

巴戟天 川芎 山藥 白朮 白芷 陳皮

黃芪 吳茱萸 桂心 枳殼 紫朴 肉蓯

牛膝 龍骨 黑乾薑

一兩

共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十九日二

白馬蹄湯 治赤白帶下淋瀝不止色敗如五色者

白馬蹄

剉炒焦二兩

白龍骨

禹餘糧

兩半

白殭蠶

赤石脂

附子

懷熟地

牡蠣

醋淬

炙甘草

一兩

川歸

烏賊魚骨

燒灰兩半

水煎三錢入酒少許溫服日二

鹿茸散 治漏下久不止

鹿茸

去毛炙

阿膠

粉炒

烏賊魚骨

去甲燒灰兩半

川歸 蒲黃

微炒
一兩

共末酒下二錢日二

龜甲散 治漏下赤白經久不止

龜甲

醋炙

牡蠣

童便淬
二兩

共末空心酒下一二錢日二以差為度

白朮散 治赤白漏下不止

白朮

土炒

川栢

炙兩
半

白薇

炒五
錢

共末溫酒下二錢日二

大黃散 治漏下青色

大黃

炒三分

牡蠣

童便淬

子芩

桂心

一分

白薇

五錢

共末酒下二錢

蒲黃散 治血漏不止日久虛損

蒲黃

微炒二兩

鹿茸

去毛炙

川歸

酒炒一兩

共末酒下二錢日二

黃芪湯 治漏下赤白淋瀝不斷

黃芪

炙兩半

阿膠

粉炒二兩

炙甘草

一分

大棗肉

五十枝

水煎三錢服

經血暴下

即血崩

論曰女人經血謂之月事者常以三旬而一見也若血氣和平則所下應期若衝氣虛則經血不能制約故令暴下不止乃至數升也

生地散 治血傷暴下不止腰脚疼重倦怠無力心煩

渴燥面目虛浮

懷生地

黃牛角

鰓燒灰

酸石榴皮

炙

人參

白芷

炙甘草

陳皮

地榆

炙

川續斷

共末飲下二錢日二

劉寄奴湯

治血下不止臍下虛痛

劉寄奴

赤芍藥

二兩

艾葉

炒四兩

白茯苓

一兩

川芎

川歸

兩半

水煎三錢溫服日二

如聖散 治經水暴下不止

櫻櫚皮

燒灰
一兩

烏梅肉

黑乾薑

三味並燒存
性各一兩

共末用烏梅湯下一錢日二久患不過三服

續斷丸

治經水漏下日久不止或五色相兼而下面

萎黃肌體瘦腰重無力

續斷

赤石脂

炙甘草

阿膠

粉炒

川芎

丹參

地榆

車前子

側柏葉

鹿茸

川歸

一兩

龜甲

醋炙

懷生地

黃牛角腮

共末入蜜杵九梧子大酒下三十九

白芍藥散 治經水不止兼五色雜下不定日夜不止

白芍藥 黃芪 白茯 白龍骨

一兩

烏賊魚骨

醋炙

桂心

附子

乾薑

牡蠣

醋淬五錢

懷生地

三分

共末酒下二錢日二

地黃湯 治經血不止顏色不定

懷生地

五兩

子芩

熟艾葉

川歸

二兩

側柏葉

伏龍肝

蒲黃

微炒

生薑

三兩

地榆

四兩
炙

水煎三錢溫服日二

二灰散 治經水暴下不止

蠶絲

燒灰

箬葉

用茶簍內者
燒灰各一兩

同研勻酒下一二錢日二

禹餘糧九 治經血不止氣弱黃瘦

禹餘糧

米醋淬
七次

附子

去皮
臍炮

川芎

川歸

三分

白芷

黃芪

蜜炙

白龍骨

桂心

白石脂

共末入蜜杵九梧子大丹砂為衣酒下二三十丸日

二

經血暴下兼帶下

論曰女人臟腑久冷故有赤白帶下復因衝任氣虛不能制約經血以致暴下則二病兼作故謂經血暴下兼帶下也

黃牛角鰓丸 治經水暴下兼帶下經久不止面黃困

劣

黃牛角鰓

燒灰

赤石脂

兩半

鹿茸

去毛炙

桑白皮

炒

阿膠

粉炒一兩

艾葉

炙二分

白龍骨

煨三分

黑乾薑

一分

共末入蜜杵丸梧子大酒下

白芍藥酒 治經血暴下兼帶下經久不差

白芍藥

炒

懷生地

黃芪

炙三兩

艾葉

炙一兩

酒一斗浸七日服

牛角鰓散 治傷血並帶下

黃牛角鰓

酒炙焦

側柏葉

炙

川續斷

炒

熟艾 伏龍肝 川歸 赤石脂 一兩 地榆

共末酒下二三錢日二

人參散 治血傷兼赤白帶下日久不止

人參 五味子

艾葉

燒灰

白茯苓

牡蠣

醋淬

地榆 白龍骨 懷熟地 炙甘草 川芎

續斷

一兩

共末空心用酒下一二錢日二

白茯苓丸 治血傷兼帶下積久不止漸成虛勞面黃

腰脚沉重

白茯苓 栝子仁 訶勒皮 兔絲子 木香

杜仲炒 赤石脂 五加皮 懷熟地 秦艽

川歸 石菖蒲 青皮 黃牛角鰓切燒灰

烏賊魚骨去甲燒灰 艾葉燒灰一兩

共末酒下二錢日二醋糊丸亦可

生地湯 治血傷帶下

懷生地炒 川歸 阿膠 黃芪炙一兩 艾葉炒三分

生薑水煎三錢溫服日二

烏賊魚骨丸 治血海虛敗赤白帶久下不止肢體虛

熱煩躁頭目旋運口舌乾澀

烏賊魚骨

去甲燒灰

白芍藥

川歸

山萸肉

川芎

訶勒皮

酸棗仁

白茯苓

覆盆子

玄參

萆澄茄

懷熟地

地榆

黃芪

炙一兩

共末蜜丸梧子大酒下三十丸

黃芩湯

治經水暴下帶兼赤白不止

懷生地

二兩

子芩

蒲黃

微炒

熟艾

側柏葉

川歸

五錢

水煎三錢溫服日二

車前子湯

治經血暴下兼赤白帶下經久不止

車前子

子芩

懷生地

淡竹葉

阿膠

炒一兩

水煎三錢服

白龍骨散

治經血暴下兼赤白帶下不止

白龍骨

續斷

鹿茸

赤石脂

肉蓯蓉

白芍藥

懷生地

炒

烏賊魚骨

去甲燒
灰二兩

共末用米飲下二錢日二

婦人血分

論曰血分者經水通之際因寒濕傷其衝任為之中止
氣壅不行播在皮膚邪氣相搏經血分而為水發為肘
腫故曰血分脉經曰經水前斷後病水者名為血分久
之不治積成水腫即難治也

枳實散 治血分身體浮腫心腹煩滿不能食

枳實

麩炒

牛膝

青皮

去白炒

猪苓

去黑皮

桑白皮

川歸

炒一兩

木香

牡丹皮

防己

大黃

炒

檳榔

煨

甘遂

炒五錢

人參

一兩

共末湯下二錢日二

檳榔湯

治血分上攻頭面身體浮腫心煩熱滿悶

檳榔

微炒

赤芍藥

郁李仁

牽牛子

炒

人參

牡丹皮

百合

木香

五錢

赤茯苓 牛膝

枳殼

炒三分

知母

鹽酒炒一分

水煎三錢溫服日二

婦人水分

論曰水分者以水氣上溢于皮膚分散于四肢發為肘腫蓋腎者胃之闕闕門不利故聚水而從其類也此病與血分相似而治療有先後耳

赤茯苓 治水氣在皮膚浮腫經水不通

赤茯苓 赤芍藥

澤漆

微炒

木通

防己

一兩

猪苓

皮去黑

小海蛤

澤瀉

兩半炒

桂心

陳皮

炒三分

共末入蜜杵丸梧子大桑白皮湯下三四十丸日二

防已飲 治水病浮腫因經水斷絕名曰水分

防已

澤漆

子芩

玄參

陳皮

一兩

赤茯苓

葶藶

炒

杏仁

白朮

猪苓

大豆

炒兩半

桑白皮

炙一兩

水煎三錢服

欽定四庫全書

聖濟總錄卷二十三

十九

甘遂丸 治水分四肢浮腫經水斷絕

甘遂

微煨
一兩

天冬

去心

川連

兩半

葶藶

紙炒
二兩

苦胡蘆

一枚
取瓢

共末蜜杵丸小豆大酒下十九至十五丸水利止服

木通散 治水分先病水腫日久不消致經水斷絕

木通

赤茯苓

石韋

去毛

桑白皮

防己

澤瀉

三分

大腹皮

四枚

水煎五錢溫服日二 如水通利少服

婦人無子

論曰婦人所以無子者由衝任不足腎氣虛寒故也內經謂女子二七而天癸至任脉通太衝脉盛陰陽和故能有子若衝任不足腎氣虛寒不能繫胞故令無子亦有本于夫病婦疾者當原其所因而調之

白薇丸 治婦人久無子

白薇 川歸 人參 附子 川芎 藁本

禹餘糧

兩

石斛 熟地 栢子仁 紫參

薑黃 川椒 桑寄生 牛膝 五味子

桂心 吳茱萸 防風 甘草

五錢

共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十丸日二

澤蘭葉丸 治久無子

澤蘭葉 川歸 白龍骨 陳皮

去白炒

遠志

菴藺子 川芎 桃仁

去皮尖炒

禹餘糧

醋淬七次研

紫石英 藁本 蒲黃

微炒

覆盆子 白芷

卷栢

一兩

人參

麥門冬

黑乾薑

車前子

懷熟地 細辛 白茯苓 赤石脂 川椒炒

石膏 白薇 蛇牀子

五錢

共末蜜丸梧子大酒下

妊娠門

妊娠惡阻

論曰婦人所食穀味化為血氣下為月水凡妊娠之初月水乍聚一月為牒二月為胚三月為胎胎成則男女分方食于母而口如鳥在牒胚之時血氣未用五味不

化中氣壅實所以脾胃不思穀味聞見于物即惡心有
所阻也其病心中憤悶頭重目眩四肢怠惰惡聞食氣
是矣

茯苓湯 治妊娠惡阻嘔逆肢疼頭痛惡聞食氣心忪
煩悶多損墜宜安胎調血脉

白茯苓 旋覆 生地 二兩 人參 白芍 陳皮

桔梗

炒

細辛

芎藭

甘草

半兩

水煎三錢

橘皮湯 治妊娠惡阻嘔吐不下食

陳皮

竹茹

人參

白朮

三兩

厚朴

二兩

薑水煎三錢

柴胡飲 治惡阻頭疼瘦弱不思食嗜臥

柴胡

赤芍

人參

麥冬

黃芪

甘草

炙五錢

生地

兩半取汁

水煎三錢入地汁一分日二

人參飲 治惡阻煩悶嘔噦吐逆惡聞食氣頭眩肢節

疼嗜臥出汗黃瘦

人參 麥冬 白朮 生薑

分三

陳皮 甘草

炙五錢

大棗

五枚

共分二劑每劑水五鍾煎二鍾分三服頃再服

茯苓飲 治惡阻煩悶頭眩憎聞食氣聞便嘔逆四肢不能自持

白朮 人參 白朮 防風 枳殼

炒

生薑

五錢

甘草

炙一分

分為二劑每用水四鍾煎半分二服頃再服

妊娠漏胎

論曰妊娠將理失宜經血時下謂之漏胎由衝任虛弱不能固養胞胎故令經血時下如器之漏也久漏不已則胎氣無所稟養必致萎燥矣

續斷飲 治妊娠漏胎下血不止腹內痛

續斷

二兩

艾葉

熟地

當歸

一兩

竹茹

阿膠

雞蘇

五錢

為粗末水煎三錢日二

艾葉飲

治漏胎淋瀝不止

艾葉

錢五

乾薑

當歸

分三

芎藭

兩一

薑水煎三錢日二

膠艾湯

治漏胎下血過多

阿膠

錢五

艾葉

兩一

水煎三錢日二

黃芪湯

治五六月下血

黃芪

兩半

熟地

桑寄生

地榆

一兩

艾葉

龍骨

三分

薑棗水煎五錢日二

竹茹桑寄生湯

治漏胎心腹痛時下血

竹茹

桑寄生

艾葉

白芍

阿膠

白朮

各等分

水煎三錢

當歸阿膠散

治胞漏下血不止

當歸

阿膠

熟艾

錢五

龍骨

二分

蒲黃

炒

地榆

三分

牛角

鰓炙焦

熟地

一兩

共末酒飲任下二錢日二

妊娠胎動下血

論曰妊娠之人將護為難若觸冒風寒飲食生冷及喜
怒勞動之過致患胎動胎動則氣血失度故下血也古
方云母有宿疾子藏為風冷所乘者亦令胎動下血皆
失將護所致

阿膠湯 治胎動腹痛下血運悶

阿膠

一兩

生薑

炒

側柏葉

桑寄生

當歸

艾葉

三分

竹茹

一大團

芎藭

續斷

五錢

東水煎三錢

鹿角膠湯 治胎動漏血不止

鹿角膠

一兩

人參

白茯苓

五錢

水煎三錢

阿膠散 治損動胎氣腹內結痛血下不止運悶

阿膠 桑寄生 二兩 人參 懷熟地 白芷

芎藭 一兩 續斷 兩半

共末竹茹糯米湯下三錢

秦朮湯 治胎動下血身體煩熱倦怠

秦朮 人參 炙甘草 芎藭 地榆 白芷

鹿角膠 五錢

糯米一撮水煎五錢

芍藥散 治胎動下血不止臍腹痛迷悶昏塞

白芍

木賊

一兩
炒

牡蠣

熟地

乾薑

烏賊魚骨

去甲
五錢

共末酒下三錢

人參飲

治胎動腰腹痛血下不止

人參

芩薊

當歸

阿膠

杜仲

二兩

熟地

炙甘草

一兩

艾葉

一把

棗水煎五錢

妊娠胎萎燥

論曰人由受氣于有生十二經脉迭相滋養尤生物也得寒溫之正土地之宜無物不長凡胎處胞中或有萎燥者蓋由孕婦所稟怯弱不足自周陰陽血氣偏係非冷即熱胞胎失于滋利所以萎燥而不長也日月雖過不能生育亦有後時致生惟宜資母血氣俾陰陽調通本末相應則胎從而有養矣

艾葉湯 治胞中冷致胎萎燥

艾葉

炒

芎藭

當歸

炒

白朮

乾薑

一兩

水煎三錢日三

白朮湯 治萎燥瘦劣面黃黑腹藏虛冷

白朮

炒二兩

人參

當歸

白芍

芎藭

訶勒皮

厚朴

炙甘草

五錢

薑水煎三錢日三

白朮當歸湯

治胎萎燥漏下腹痛不可忍

白朮

當歸

人參

芎藭

阿膠

二兩

艾葉

一兩

酒水煎五錢入大棗分三服

桑寄生湯 治胎萎燥不能轉動心中急痛

桑寄生 人參 白茯苓 萎蕤 白朮

一兩 二兩

薑水煎三錢入粳米半合溫服日二

地黃湯 治胎萎燥過時未產滋氣血益胞臟

熟地 當歸 熟艾 芎藭 阿膠

一兩 二兩

炙甘草

五錢

水煎三錢日二

妊娠胎不長養

論曰妊娠將理無方脾胃不足飲食減退不能行榮衛化精微養衝任故令胎臟內弱子氣不足生化稍虧巢元方謂母病療母則胎安是也若使脾胃和而能飲食水穀化而運氣血則何慮胎氣不長也

白朮散 治胎不長養

白朮

一兩

人參

白芍

芎藭

阿膠

一兩

炙甘草

五錢

共末葱粥飲下三錢日三

地黃湯 治氣血不足胎瘦不長

熟地 阿膠 芫薺 當歸

二兩

人參

赤芍 炙甘草

五錢

水煎三錢入粳米日三

妊娠嘔逆不下食

論曰妊娠之人脾胃氣弱風冷乘之則中焦痞膈胃中虛滿其氣上溢氣不下降故雖食飲卒不得下甚則嘔

逆

扶神湯 治妊娠嘔逆不下食和胃順氣

扶神 黃芪 人參 白朮

錢五

藿香 甘草

錢二

薑水煎二錢

人參湯 同

人參 山藥 白朮 粳米

陳者
一兩

半夏

錢五

薑棗水煎三錢

保生湯 治妊娠嘔逆不下食

陳皮

二兩

人參

白朮

麥冬

厚朴

白茯苓

一兩

薑棗水煎四錢入竹葉

厚朴湯

同

厚朴

人參

白茯苓

白朮

陳皮

竹茹

半夏

一兩

薑水煎三錢

妊娠咳嗽

論曰妊娠咳嗽者以肺感寒氣也經曰形寒飲冷則傷

肺久嗽不已則寒氣相移不惟妊育有傷而肺氣痿弱
皮毛枯悴治宜發散寒邪資補胎氣則咳嗽自己

麥冬飲 治咳嗽不止

麥冬

兩一

紫苑

杏仁

桔梗

炒三分

炙甘草

分一

桑白皮

錢五

水煎三錢入竹茹白蜜日三

人參散 治妊娠咳嗽

人參

陳皮

炙甘草

兩三

生薑

切五兩

共末湯下二錢

桑白皮丸 治妊娠咳嗽痰盛嘔逆

桑皮

二兩

半夏

人參

阿膠

一兩

丹砂

一分

炙甘草

五錢

共末粥丸 芡實大臨臥含化一丸

妊娠傷寒

論曰妊娠感冒寒邪藏于皮膚灑然而寒燐熱而悶頭項痛腰脊強脉浮在表者當汗之在裏者下之汗下之

理制方宜輕但非破血傷胎之劑和其陰陽正其表裏
使經不傳邪無深入斯無危殆矣

麻黃湯 治妊娠傷寒發熱惡寒體痛

麻黃 蒼朮

三兩

陳皮

二兩

白朮

炙甘草

一兩

水煎三錢入葱白鹽豉

異功湯 治妊娠傷寒頭痛體疼安胎和氣

麻黃

去根節
四兩

白朮

蒼朮

二兩

芎藭

炙甘草

兩半

葱白水煎三錢日三

柴胡湯 治妊娠傷寒憎寒壯熱頭痛身疼

柴胡 白朮一兩 芎藭 白芍藥 當歸

防風 赤茯苓一分 黃芩 生地五錢

薑棗水煎三錢

白散子 治妊娠傷寒護胎

白藥子研末

用雞子清調塗紙上約碗大貼在臍下乾以溫水潤

之

妊娠下痢

論曰妊娠飲食過傷脾胃不和冷熱之氣入于腸間腸虛則泄故為痢也然冷多則白熱盛則赤冷熱相攻赤白相雜甚則膿血雜下速宜療之恐傷胎也

阿膠九 治妊娠下痢日夜頻瀉并安胎氣止腹痛

阿膠

酸石榴皮

錢五

川連

兩一

當歸

肉豆蔻

錢三

共末蜜丸小豆大飲下十五丸

黃連湯 治妊娠下痢頻瀉并裏急後重

川連

炒

黃栢

三兩

白朮

四兩

薑水煎五錢日三

健脾湯 治妊娠下痢臍腹撮痛益胃氣思飲食

厚朴

蒼朮

四兩

人參

二兩

大棗

一升煮熱去皮核研棗汁五升

與朴朮同煮乾

陳皮

去白炒

白茯苓

二兩半

炙甘草

二兩

薑水煎三錢進飲食調脾胃

阿膠丸 治妊娠下痢膿血不止腹痛

阿膠

三兩

白朮

五兩

川連

肉豆蔻

一兩

共末蜜丸梧子大飲下三十丸

黃栢散

治妊娠赤白痢腹痛腰疼如欲產

黃栢

微炒

當歸

赤芍藥

阿膠

艾葉

芎藭

桑寄生

一兩

炙甘草

乾薑

三分

共末水煎四錢

阿膠散

治妊娠赤白痢腹痛不止

阿膠 當歸

一兩

白朮

三分

艾葉

炒

石榴皮

炒五錢

共末薑水煎四錢

妊娠子淋

論曰婦人懷子而淋者謂之子淋因腎虛膀胱經客邪熱令洩少而數水道澁痛引于臍者是其候也

海蛤湯 治妊娠子淋頻數澁痛

海蛤 木通

猪苓

五錢

冬葵子

微炒

滑石

一分

水煎三錢入燈心三十根

白芷散 治妊娘子淋頻數澁痛

白芷

三分

阿膠

鬱金

滑石

一分

共末葱白湯下二錢

當歸湯 治妊娘子淋澁痛

當歸 白芍藥 赤茯苓 炙甘草 山梔子

等分

水煎三錢

妊娠浮腫

論曰脾合土候肌肉土氣和平則能制水水自傳化無

有停積若妊娠脾胃氣虛經血壅閉則水飲不化濕氣
淫溢外攻形體內注胞胎懷妊之始腫滿必傷胎氣如
臨月而脚微腫利其小便則病自愈

防已湯 治妊通身浮腫喘促小便澀

防已

大腹

分三

赤茯苓

桑白皮

分一兩

木香

紫蘇

分一

薑水煎四錢

木通湯 治妊身體浮腫心腹脹滿小便不通

木通 香薷 桑白皮一兩 木香 訶勒皮

黃芩

分三

枳殼

炒

檳榔

紫蘇

錢五

薑水煎四錢日二

赤茯苓湯 治妊娠身體浮腫心腹急滿小便赤

赤茯苓

一兩

白朮

旋復花

錢五

木通

杏仁

黃芩

分三

薑水煎三錢

赤茯苓飲 治妊娠胎間水氣子滿體腫

赤茯苓

白朮

二兩

杏仁

旋復花

一兩

黃芩

兩半

水煎五錢日二

桑寄生飲

治妊娠偏身虛腫

桑寄生

紫蘇

一兩

木香

五錢

桑白皮

炒

大腹皮

三分

水煎三錢

妊娠小便不通

論曰妊娠小腸挾熱熱結胞內使氣道痞澀故小便不

通令人腹脇脹滿臍下急痛是其証也

榆白皮散 治妊娠小便不通心神悶亂小腹急痛

榆白皮 王不留行 滑石

一兩

共末燈心湯下二錢

冬葵子湯 治妊娠淋小便澀小腹急水道熱痛

冬葵子

三合

赤茯苓 白芍藥 車前子

一兩

黃芩

五錢

水煎五錢

滑石傳 治妊娠子淋小便數熱痛手足煩疼

滑石 飛

汲水調五錢塗臍下一寸小便即利未利再塗

妊娠大小便不通

論曰妊娠大小便不通者以臟腑盛實熱氣蘊積不時宣導之所致也若熱結于大腸則大便不通結于小腸則小便不通今大小腸俱有熱則二便俱不通其候令人煩滿小腹脹急惟能均調腑臟使氣疏達則轉化無

所留滯矣

梔子湯 治妊娠二便不通臍腹脹痛

梔子

黃芩

柴胡

姜蕤

兩半

石膏

四兩

澤瀉

赤芍

二兩

車前草

五錢

水煎四錢入竹葉十片

茅根湯 治妊娠二便不通結悶氣急腹滿欲死

茅根

滑石

車前子

大黃

炒各等分

水煎四錢

又方 治妊娠二便不通

豬脂

二兩

酒半升煎脂化分三服未通再服

妊娠半產

論曰妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產蓋由
妊婦衝任氣虛不能滋養于胎胎氣不固或顛撲閃墜
致氣血損痛或因時病痢瘧之類皆致半產
延胡索湯 治半產後氣血不快惡露續斷

延胡索 當歸 白芍藥 炙甘草 芍藥

桂心

一兩

水煎三錢

艾葉飲 治半產後惡露不斷心悶氣短

艾葉 生地黃 當歸 人參 地榆

乾薑 阿膠

各等分

水煎三錢

妊娠數墮胎

論曰胚胎之始賴血氣以滋育若妊娠血氣盛強陰陽之氣和相與流傳于一體唯能順時數謹人事勿動內傷則生育之道得矣衝任氣虛將攝失宜子藏風冷不能滋養于胎故每有妊則數致傷墮也

地黃散 治數墮胎子宮虛冷

熟地 黃芪 人參 白朮 芎藭 當歸

一兩

吳茱萸 炙甘草 乾薑

五錢

共末酒下二錢

阿膠湯 治數墮胎小腹痛不可忍

阿膠 熟地 艾葉炒 芎藭 白朮 當歸

杜仲炒一兩

棗水煎四錢服

地黃湯 治妊娠氣血衰微胞臟挾冷數墮胎

熟地黃四兩 艾葉 當歸二兩 杜仲 芎藭


阿膠 五加皮三兩

水煎五錢日二

芎藭湯 治數墮胎心腹痛

芎藭 白芎藥 白朮 阿膠 炙甘草 一兩

艾葉糯米薑水煎三錢



聖濟總錄纂要卷二十三

欽定四庫全書

子部

聖濟總錄纂要卷二十四

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣范廷驊

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷二十四

休寧程林纂

產難門

逆產

論曰逆產者蓋因妊婦初覺腹痛產時未至驚動傷早
兒回轉未至竟便用力產之即令逆也

牛酥膏 治逆產數日或生不以理橫逆艱難千方百

計不安急宜服之膏至臍身上即產下

真牛酥

秋葵子一升

大豆黃卷

滑石

二兩

瞿麥

一兩

白蜜

半升

秋冬二葵子功用并同

共末用酥煎沸入蜜再煎下末攪勻收貯酒下一二

匙頻服

半夏飲 治橫產及倒生胎死腹中并衣不下母氣欲

絕者

半夏

五枚薑汁炒

白斂

一兩

共末溫酒下二錢難產一服橫產二服倒生三服胎
斃衣不出四服此方加瞿麥尤佳

竈心黃土塗 治逆產

竈底心黃土

研五
合

以生薑汁和如糊塗產母臍中以帛繫換

小麥飲 治逆產

小麥 小豆

炒一
兩

共末水煎二三錢溫服少頃又服

鹽粉塗 治逆產足下

食鹽 胡粉

共研勻用米醋和塗免足心即順下

蔥蒜薑法 治逆產

大蒜 七枚 生薑 五錢 葱白 三十根

共搗入盆中以沸湯五大碗投盆內速扶產婦坐盆上薰產戶冷即易之三易胎正矣

丹砂塗 治逆產

丹砂

五
分

用蜜和塗兒足心又以丹書兒左足心千字書右足

心里字

又法

以鍼刺先出足底足痛還即順若手先出即刺手

又法

取三家鹽熬令黃以津唾和塗兒足心次取三家飯

放兒母手中佳

艾葉湯 治逆產及子死腹中

生艾葉

五兩

用酒一升煎旋服則順下如不飲酒以水煎服

蛇脫灰酒 治逆產及子死腹中

蛇脫

燒灰

研末用白酒和下面向東方服一錢末下再服

兔絲子酒 治逆產及子死腹中

兔絲子

炒

為末酒下一二錢即生 一方以車前子為末酒下
二錢

蒲黃塗 治逆產

蒲黃

用水和塗兒手足心即順

難產

論曰臨產或難蓋為正氣擾亂心神不寧所致古人有
預備方法臨月用滑胎散并日行二三十步貴使血氣

下順產無留難無令喧雜驚忙必須產閣溫暖遇嚴寒
之日四圍燒火及多備熱湯焚諸異香常令湯火氣及
身暗使人看候產婦纔覺腹痛速與飲食令飽無使困
乏飢則雌雞煮粥渴則白蜜煎湯或空痛經日兒胎未
動者宜安心熟忍以薦蓆鋪牀就上安產免為地氣所
侵又就週行三五百匝或困于行暫且扶立須臾又行
如血水俱下痛陣及腰此欲產之兆諸餘法度宜次序
行之

車前子散 治難產經日不下

車前子

微炒

滑石

川歸

五錢

榆白皮

瞿麥穗

一兩

共末用酒下二錢如血水未下用大黃二錢煎酒服

胞胎即下

如意膏 治難產催生

蓖麻子

二十一粒
去殼研

丹砂

五分

共研如膏用油紙攤貼臍下小腹間外用帛繫縛候

產與胞衣下速去之稍緩即脫人氣血此藥覺腹痛便
宜用

牛酥膏

治難產催生

見前逆產

苧麻根飲

治難產及晚嫁難產

乳母論云三十後適人者謂之晚嫁也蓋少嫁則筋骨軟弱故產門易開晚嫁則筋骨堅強所以難產產婦臨月宜常服之

苧麻根

人參

陳皮

炒

懷生地

炙甘草 烏梅肉

一兩

生薑水煎四錢溫服少頃又服

燒弓弦散 治難產

弓弦

五寸燒
灰研

箭幹

五寸
燒灰

共研勻作一服酒下

牛酥飲 治數日不產胎上冲心欲死

牛酥

五錢

冬葵子

炒一
合

滑石

研三
分

共入袋盛用酒一升煮頻服一鍾

白芍散 治數日不產胎上冲心欲死

白芍 川芎 甘草 川歸 茯神 陳皮

二兩

芎藭根

一把

髮灰

一分

共末空心食前酒下二錢少頃又服

桂心湯 治難產數日不生子死腹中母氣欲絕者服之效

桂心

兩半

木通

牛膝

瞿麥穗

榆白皮

二兩

水煎五錢服

石燕酒 治難產催生 一方兩手握石燕亦產

石燕以童便磨取三四錢微溫吞赤小豆七粒立產

子死腹中

論曰胞衣未下急于胎之未生子死腹中危于胎之未下蓋胞衣未下子與母氣通其呼吸若子死腹中胞臟氣寒胎血凝滯氣不升降所以難下古方多以行血凝氣藥及硝石水銀礞砂之類其胎已死軀形已冷血凝氣聚復以至寒之藥下之不惟無益而害母命者多矣

古人用藥深于用意但後生不分子死理有二端用藥
寒溫各從其宜有妊娠胎漏血盡子死者有墜墮顛撲
內傷子死者有緣久病胎萎子死者若此之類遂令生
人提掣姪婦使身體平正仍以衾蓐自腰抵定令仰臥
開足向地如欲產勢連進附子湯三服方見後即以衣色
溫瓦數片二三人不住手自臍腹腰脇左右周回熨之
使胞臟溫煖凝血流動蓋附子湯能破寒氣墮胎服之
少頃覺腹內痛陣漸作惡血漸動良久必產此用溫藥

之意也有因傷寒熱病溫瘧之類胎受邪熱毒氣內外
交攻因致胎死胎不即下留于胞臟古人慮胎受毒氣
必致脹大所以用硝石水銀礪砂之藥蓋硝石水銀之
性不惟使胎不脹大又能使胎化爛副以行血順氣之
味死胎即下臨產更令生人以手體候胎有橫有逆有
脹有爛以意治之庶免留難凡生產之理胎活則所生
子日月已周臍繫不養所以自下由之果實既熟不俟
剪折帶蒂自分若子死腹中則所生在母日月未足臍

繫尚固由之果實未熟枝末雖枯不折不離所以在母行之有法用之有度斯無虞矣凡審死胎當熟辯有妊之婦病胎隱伏不動難認存亡令生人以煖手就臍下欸欸按至胎處覺腹中冷應手是胎已死稍溫即非更看妊婦外症面青舌冷舌下脉青黑口穢氣手指甲黑皆子死之候

附子湯 治子死腹中產後氣寒胎血凝冱子死難下
破寒墮胎

附子

大者一枚生去皮臍切十片

生薑

五片

水煎稍熱服經時不下服桂心湯

桂心湯

治子死腹中產後氣寒胎血凝沍子死難下

寒墮胎

桂心

不見火

烏頭

大者一兩

水煎稍熱連用三服

地黃酒

治子死腹中未下

懷生地

酒洗搗取自然汁

用酒煎沸和地黃汁連三服胎不下服牛膝湯

牛膝湯 治子死腹中氣血凝結致子難下

牛膝

朴硝

三兩

川芎

大黃

炒

桂心

蒲黃

五錢

懷生地

二兩

水煎五錢去滓入朴硝一錢再沸服連進三服未下服後瞿麥湯

瞿麥穗湯 治子死腹中三日不出母氣欲絕

瞿麥穗

兩半

牛膝

榆根白皮

一兩

木通

桂心
三分

水煎五錢去滓服連進三服胎未下服後牛膝湯

牛膝湯 治子死腹中滑氣血破胞胎或子死壞爛母

氣悶絕者

牛膝一兩 川歸 桂心三分 川芎 蒲黃五錢

硝石 瞿麥穗二兩 懷生地汁一鍾

水煎五錢入汁再沸連進三服惡血下子即出也或

胎已損令生人仔細探之勿令腐肉瘀在腹內出畢

再一二服逐惡免生他病

薑汁酒 治子死腹中氣血凝滯不下

生薑汁

分六

雞子黃

枝三

白酒

分三

米醋

分二

共酒醋同煎入薑汁二分再沸傾碗中入雞黃一枚
乘熱打轉稍熱服須臾依上法連進三服

牛尿塗 治子死腹中二三日不下

牛尿

用之塗兒母臍腹上并左右少頃立出

水銀飲 治子死腹中悶絕者

水銀

一兩

飲下若母不知人事幹開口灌下口幹不開當于鼻中灌下令頭稍仰銀入母腹中立出

又方

竈中黃土

研末用酒和服二三錢立下

息胞

即胞衣不出

論曰凡產子母已分而胞衣未下名曰息胞蓋由欲產之時用力太過產罷又被風寒冷氣所侵血氣凝澁之力運用以致持久不惟有妨兒臍兼亦致害母命急須提掣產母使形體平正氣息少待可以運動及以壯氣益血湯散助之俾氣血滑利其胞可下矣若初生產婦未經諳練見胞衣未下恐妨兒體輒便剪臍或誤牽斷或執握不固其胞直上掩心使不盡天年者多矣古人剪臍之法必用慣熟生人先備金銀銅鐵稱錘之類用

軟熟衣帶一條結定以緊牽為度所貴胞不上掩心也
壯氣益母湯 治胞衣未下被風寒所侵血氣凝澁或
氣少力乏不能運用胞衣停息

懷生地

人參

川歸

一兩

代赭石

醋淬五錢研

木香

一分

生薑大棗水煎五錢稍熱服少頃又服以衣下為度
牛膝湯 治胞衣半出半不出或子死腹中著脊不下
及二三日不產血氣上冲

牛膝 秋葵子

榆白皮

三兩

懷生地

取汁三分

水煎五錢入汁服

滑石湯 治胞衣不出服之爛胞

滑石 川歸

炙甘草

一兩

牛膝

瞿麥穗

兩半

秋葵子

二合

水煎五錢稍熱服少頃再服以下為度

惡血不下盛于衣中

鹿角

剉為細末用酒下一二錢以下為度

蓖麻子塗 治胞衣不下

蓖麻子

二十
一枚

去殼研如泥塗腳心衣下速去

又方 治胞衣不下

水銀

用棗肉研不見星九皂子大酒服一九立下

冬葵子酒 治衣不下令爛胞

葵子 阿膠 牛膝 川歸 一兩

共末酒下三錢

產後血運

論曰產後血下或多或少者皆致血運蓋血隨氣行血多者氣虛血少者氣逆故也其候頭目旋轉精神昏憤沉默不知人事治法虛弱者宜調氣而益血氣逆者宜調氣而下血則運思過半矣

玄胡索湯 治產後血運

玄胡索

川芎

一兩

人參

川歸

牛膝

兩半

懷生地

二兩

水煎五錢去滓入蜜少許稍熱服

益母草飲 治產後血運心煩悶亂恍惚如見鬼神

益母草汁

如無以土瓜根汁代之

生地汁

藕汁

半鍾

雞子白

三枚

童子便

一鍾

將四汁煎沸入雞子白攪勻分三服連進

紅藍花湯 治產後血少運悶嘔逆

紅藍花 蘇枋木

一兩

水煎四五錢稍熱服日二

薑黃飲 治產後惡血上掩心如見鬼神欲死

生薑汁 生地汁

一鍾

用白酒一鍾同二汁煎十數沸稍熱服

醋雞子 治產後血運迷悶不省人事唇口冷面青

米醋 雞子

一鍾

生一

枚

將醋煎沸以雞子打破攪勻頓服

白芍湯 治產後血運心中迷悶不知人錯亂少氣

白芍藥 懷生地

炙甘草

一兩

丹參

五錢

生薑水煎五錢去滓入蜜少許連進三服

產後語言妄亂

論曰憂愁思慮則傷心心虛故邪從之新產之人內亡津液而血虛志弱使人精神昏亂語言差謬恍惚不寧甚者變狂顛之症治宜補血益心安心定志其病自愈
白茯苓湯 治產後血氣虛弱精神不安言語錯謬

白茯苓 人參 桂心 澤瀉 蒲黃

兩半

懷熟地 川歸 麥門冬 遠志

兩一

共末入蜜杵丸梧子大人參湯下三四十丸

白茯苓湯 治產後心氣不足血虛狂言

白茯苓 熟地

兩二

人參 甘草 防風

白薇 龍齒 獨活 遠志

兩一

水煎四五錢稍熱服

茯神湯 治產後血虛狂言妄語心志不寧

茯神

兩二

人參

白芍藥

兩半

桂心

川歸

炙甘草

兩一

生薑大棗水煎四五錢稍熱服日二

遠志湯

治產後血虛心氣弱為風邪所搏語言妄亂

遠志

人參

赤芍

白茯

子芩

獨活

炙甘草

防風

兩一

懷熟地

兩二

水煎四五錢熱服日二

產後中風

論曰產後血氣未完風邪乘之入于經絡則發為瘧其
候口噤不開筋脉攣急面目喎痺至于五臟六腑則隨所
中而症候出焉甚者癱瘓直視角弓反張神志昏塞便
溺遺失瘖不能言為中風之證

小續命湯 治產後失血中風口眼喎斜冒昧不知痛
處拘急不得轉側遺溺失音

麻黃

去根節
二兩

人參

附子

川芎

白朮

防己

白芍

子芩

一兩

桂心

甘草

二兩

防風

兩半

生薑水煎五錢服

大豆酒 治產後中風背強口噤或煩熱頭身皆重身
痒及嘔逆直視皆風濕所致

大豆

三升

炒令聲斷用酒五升沃熱豆中取豆汁服一鍾日飲
五七次取微汗身纔潤即愈一則去風二則消血

麻黃湯 治產後中風口眼喎斜身背拘攣

麻黃

去根節

桂心

一兩

川芎

白芍藥

防風

二分半

竹瀝

二合

白朮

炒五錢

生薑水煎五錢去滓入竹瀝半合二三服取汁

地黃酒 治產後中風口噤筋脉攣急角弓反張

生地汁

二升

白酒

三升

生薑汁

二合

用二汁煎數沸入酒再煎十數沸任性細飲數杯若冷多加桂心末二兩若熱多加藕汁二合

產後中風口喎

論曰足陽明胃經入上齒中環出挾口環唇下交承漿
手太陽經循頸上頰至目銳眥此二經皆為風寒所中
使筋脉縮急牽引于頰故為口喎癖不正語言蹇澁目
不能平視也

人參湯 治產後中風口面喎斜

人參 白芍藥 防己 白朮 甘草

防風 麻黃去根節 附子 川芎 子芩

桂心

兩一

生薑大棗水煎三錢溫服

天麻散 治產後中風口眼喎斜筋脉不利

明天麻 懷生地 白殭蠶糯米炒 玄胡索

獨活 防風 川歸 荆芥穗 桂心錢五

共末用酒下二三錢日二服

獨活湯 治產後中風口面喎斜

獨活 防風 川歸兩半 川芎 枳殼 桂心兩一

細辛錢五 蔓荊子兩半 竹瀝

水煎三錢去滓入竹瀝半合再沸服日二

竹瀝湯 治產後中風口面喎斜手足不隨語言謇澁

昏昧

竹瀝 防風 麻黃 升麻 羌活

去根節
兩半

羚羊角 川芎 桂心 杏仁

一兩
八十枚去
皮尖炒研

水煎三錢去滓入竹瀝半合再沸二三沸少頃再服

取微汗差

地汁竹瀝飲 治產後中風口眼喎斜筋脉攣急

生地汁

竹瀝

各半升

獨活

兩半

用水二鍾煎獨活三錢去滓入地汁竹瀝各半合再
二三沸溫服日二

產後中風角弓反張

論曰背為陽腹為陰陰陽之脉交相維持產後血脉不
足風邪中於陽經使陽脉拘急反引腰背如角弓反張
故以為名

麻黃湯

治產後中風角弓反張筋脉急痛

防風 人參 白朮 川芎 甘草 川歸

麻黃

去根節

桂心

一兩

附子

乾薑

五錢

杏仁

去皮尖炒四十枚

水煎三錢服日二

白茯苓湯 治產後角弓反張

白茯苓 山梔仁 川芎 川歸 炙甘草

五錢

黑乾薑 吳茱萸 懷熟地 桂心 細辛

一兩

水煎三錢溫服日二

黑豆酒 治產後中風腰背反折筋急口噤

黑豆

小者
二升

白酒

四升

將豆炒香熟傾入酒中去豆用酒不拘時頻服一鍾服完再服後地黃酒

地黃酒 治產後中風腰背反折筋急口噤

生地汁

二升

白酒

三升

生薑汁

二合

先煎二汁數沸入酒再沸十數沸任意飲二鍾若冷多加桂心末二兩熱多加藕汁二合

產後蓐勞

論曰產蓐之後食飲起居失于常度使氣血不得其養
若血虛則發熱氣虛則發寒氣血俱虛則寒熱更作日
漸羸瘦故為蓐勞又產後惡露未盡亦令致此則時寒
時熱腰腹刺痛甚者不能食食亦不作肌膚

懷熟地湯 治產後蓐勞寒熱肢體痛力乏

熟地黃 人參 白朮 白茯苓 牛膝

鼈甲 淡竹葉 桂心 麥門冬 川歸

甘草

一兩

水煎三錢溫服日二

赤芍湯 治產後蓐勞疼痛寒熱頭目旋運多驚盜汗
腹痛大便不利瘦劣

赤芍

川芍

人參

丹皮

玄參

五味子

白薇

白朮

麥冬

甘草

川歸

一兩

熟地

二兩

水煎三錢服

猪腎湯 治產後蓐勞似瘧寒熱不能食

猪腎

一對

粳米

白芍藥

知母

三分

川歸

半分

葱白

五寸

水煮腎取汁入米煎三錢溫服日二

黃芪煮散

治產後蓐勞肌瘦面無顏色或寒或熱肢

痛頭疼心煩

黃芪

鼈甲

一兩

人參

白芍藥

川歸

白茯苓

桑寄生

麥門冬

熟地

桂心

牛膝

甘草

五錢

共末每用猪腎一對煮取汁入薑棗煎三錢溫服日

二

白薇丸 治產後蓐勞寒熱體虛瘦弱不思食

白薇 附子 熟地 栢子仁 鼈甲 川歸

肉蓯蓉 黃芪 人參 白芍 丹皮 桂心

石斛

羌活

分三

川芎

甘草

錢五

共末蜜丸梧子大飲下三四十九

產後大便不通

論曰大腸者傳道之官變化出焉產後津液減耗胃中
枯燥潤養不足糟粕壅滯故令大便難而或致不通蓋
新產之人喜病此者由去血過多內亡津液故也

訶梨勒九 治產後大便不通

訶勒皮 人參 懷熟地 大黃 川歸

炒酒

大麻子 一兩

共末入蜜杵九梧子大米飲下三四十九日二

人參九 治產後大便不通

人參

檳榔

兩半

紫朴

薑炒三分

川歸

一兩

郁李仁

去皮尖
研五錢

共末入蜜杵丸梧子大酒下三四十丸日二

大黃丸 治產後大便秘澀不通

大黃

酒炒

赤芍藥

川歸

紫朴

薑炒一兩

枳實

炒

懷生地

大麻仁

三分

共末入蜜杵丸梧子大陳米飲下三四十丸

升麻湯 治產後大便秘澀

升麻 大黃一兩 生地 前胡三兩 山梔

川歸一兩

水煎服

大腹皮湯 治產後下血過多熱毒氣結燥大便不通
壅滯氣悶腰痛脇脹

大腹皮五枚 枳殼 懷生地 赤芍藥一兩

甘草 天門冬三分 羌活 郁李仁 秦朮五錢

水煎三錢溫服日二

蜜煎導法 同上

白蜜

半斤

慢煎令稠如硬飴搓指大長二寸內下部中仰臥效

烏梅導法 同上

烏梅肉

爛搗如泥入蜜少許搓內下部中即仰臥效

溫中丸 治產後大便不通七八日以上者

硫黃

生用柳木
椎細研

以水浸炊餅糊九梧子大用木香湯下一二十丸

中和散 治產後大便不通及老少皆可服

附子

去皮臍

大黃

一兩同上俱半生半炒

共末臨臥飲下二錢日二

產後乳汁不下

論曰新產水血俱下暴傷津液氣脉未順所以乳汁不下若能調其衝任治手太陽少陰之經不足則乳脉自然流行若其經虛弱氣脉閉而不通雖治之亦無益也

猪蹄湯 治產後乳汁少或不下

猪蹄

四隻用水五升
煮取汁三升

木通

漏蘆

瞿麥穗

一兩

用汁煎三錢溫服日二以效為度

木通湯 治產後乳汁不通

木通

兩半

子芩

白芍藥

桑皮

漏蘆

一兩

甘草

枳殼

炒五錢

竹葉

一把

水煎三錢溫服日二

萵苣子散 治產後乳汁不下

葛苕子

糯米

粳米

半合

水煎甘草五錢取汁煎三味分三服

括萁酒 同上

括萁

取大者一枚搗爛入白酒煎溫服以效為度

魚灰散 治產後乳汁不下

鯉魚骨

燒灰為末酒下一二錢

產後妬乳

論曰氣血流行上為乳汁下為月水上下通達不失常度是謂平人若不通而塞則為痛熱氣復來乘之則為腫向之流行者今壅遏矣倘失調治則結硬成核身體壯熱盛則憎風遂為乳癰世傳治結乳閉乳亦即為妬乳者此也

升麻湯 治產後妬乳乳汁不洩結成癰腫熱痛

升麻 玄參 白芍藥 生地黃 甘草

連翹

瞿麥穗

一兩

射干

五錢

水煎三錢溫服日二

二灰散 治乳汁不下結滯不消熱腫

蔓荊子

皂莢刺

各燒灰存性一兩

共研勻用酒下一二錢日二

升麻傳 治妬乳結成癰腫

升麻

木香

檀香

五錢

各用成塊砂盆酒磨相等用翎傳乳上

天麻草洗 治妬乳成癰腫或已破膿血未散

天麻草

不拘多少

用水煎濃汁頻洗患上日三四次差

產後乳結核

論曰產後乳結核者以血氣虛弱風邪搏之乳脉凝滯故結而為核日久不差蘊積生熱熱勝則腫腫甚則成癰也

枳殼湯 治產後乳結核或成癰腫發熱疼痛

枳殼 木通 人參 白蒺藜

炒去刺

桂心

烏雞骨

醋炙

白芍藥

川歸

黃芪

大黃

炒一兩

水煎三錢溫服日二

麥門冬湯

治產後乳結核及欲作癰腫痛

麥門冬

去心

子芩

木通

白芍藥

人參

赤茯苓

甘草

綿黃芪

桑寄生

防風

一兩

大棗水煎五錢去滓入沙糖二錢攪服

川歸散 治乳結核堅硬

川歸 人參 白芍藥 枳實 木通

麩炒三分

白蒺藜

炒

烏雞骨

醋炙

黃芪

一兩

桂心

五錢

共末酒下一二錢日二

產後乳結癰

乳癰并結核
詳見乳癰門

論曰產後衝任不足氣血俱虛其熱潛行入于足陽明之脉其直行者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中衝脉者起于氣衝並足陽明之經夾臍上行至胸中而散其經為邪熱攻衝則血為之擊搏氣為之留滯擊搏則

痛作留滯則腫生內經所謂榮氣不從逆于肉理乃生
癰腫產後多有此疾者以乳汁壅積與氣相擊搏故也
黃芪湯 治乳結核腫痛煩熱漸成癰

黃芪 生地黃 升麻 麥冬 兩半 人參 赤茯苓

苓 一兩 遠志 川歸 白芍藥 甘草 五錢

水煎三錢溫服日二

白芍湯 治乳結癰腫毒敗壞不散發熱疼痛

白芍藥 人參 赤茯苓 生地黃 川歸

黃芪 麥門冬 甘草 桂心

一兩

生薑大棗水煎三錢去滓入朴硝五分沸服日二

甘草飲 治乳癰熱痛未結膿者

甘草

五錢半
生半炙

括萇

一枚
去皮

用酒甘草取汁入萇瓢再煎服

括萇散 治乳癰膿潰未潰熱痛不已

括萇

二兩

防風 人參 細辛 紫朴

黑乾薑 敗醬 桔梗

一兩

共末用酒下二錢日二


黃芪膏 治乳癰欲結未結膿攻痛

黃芪 白芍藥 川芎 子芩 防風 川連

白斂 川歸

一兩

共末用雞子白和塗患上日二易



聖濟總錄纂要卷二十四